



BONNES PRATIQUES SANITAIRES EN CLAUSTRATION

La claustration peut être considérée comme une occasion de mieux maîtriser l'aspect sanitaire de l'élevage, car les animaux sont moins sujets aux éléments extérieurs. Cependant la claustration présente de nouveaux défis à relever, la baisse de densité permise par le plein-air n'existant plus.

Une bonne gestion de l'ambiance et de la qualité des litières (et tout élément en amont) est indispensable à la bonne santé des animaux.

Ne pas sous-estimer la prophylaxie



La vaccination des animaux doit être maintenue, voire renforcée en fonction des pathologies fréquentes sur site. En effet, en claustration les animaux sont moins susceptibles aux pathogènes extérieurs. Cependant, le pathogène circule plus rapidement entre les animaux en claustration. La vaccination est un outil de lutte essentiel pour les animaux en claustration.

Une attention particulière aux pathogènes respiratoires doit être en place. La vaccination est un levier mais la gestion de l'ambiance est essentielle. Ainsi tous les leviers de luttés contre les poussières et autres particules peuvent être utilisés ; les produits assainissant d'ambiance par exemple, peuvent limiter la charge bactérienne (fiche ambiance). L'ammoniac et l'eau, en plus des particules, ont un rôle néfaste sur les défenses respiratoires des animaux et favorisent la viabilité des microbes dans l'environnement.

Conserver les bonnes pratiques de biosécurité. ([fiche biosécurité](#))

Comment détecter et gérer les problèmes

Le suivi des animaux

Un contrôle régulier de suivi des animaux est recommandé.

Une pesée régulière d'un échantillon d'animaux, idéalement tous les 7 jours, permet de suivre les performances de chaque lot. Le poids moyen sera comparé à la courbe de croissance de référence fournie par le sélectionneur ou l'accoureur.

On contrôlera le bon emplumement des animaux par la même occasion.

De la même façon, un suivi de la consommation d'aliment cumulée en kilogramme par animal peut être utilisé et comparé à la fournie par le sélectionneur ou l'accoureur.



Ne pas oublier de se référer aux critères d'alerte influenza aviaire :

- augmentation de la mortalité journalière
- baisse de la consommation d'eau et d'aliment
- chute de ponte

PROJET BEC : BIEN ÊTRE DES CANARDS

GRILLES D'ÉVALUATION DES
CANETONS AVANT SORTIE SUR
PARCOURS (entre 16 et 28 jours
d'âge) :

- propreté ventrale
- emplumement ventral
- lésions tarsiennes
- pododermatites



En parallèle de la pesée, un examen visuel des coussinets plantaires et potentielles brosses ou brûlures de l'abdomen permet d'évaluer l'état du canard (Grille BEC en Annexe). Des notes élevées (mauvaises notes) sont liées à une mauvaise qualité de litière (attention notamment à la gestion de l'ammoniac : lien fiche litière). Cet examen visuel permet de surveiller les lésions précoces même chez les canetons.



*INRS, 2005 ; N.Bonnard, M-T Brondeau, M.Falcy, D.Jargot, S.Miraval, J-C Protois, O. Schneider ; Fiche toxicologique Dioxyde de carbone FT 238.

**ERC = échangeur Récupérateur de Chaleur

Ces contrôles peuvent permettre de détecter et corriger plus rapidement un problème éventuel sur le lot d'animaux.

Attention aussi aux troubles nerveux ! Un comportement inhabituel est souvent lié à des problèmes de santé (boiteries et autres).

PROJET BEC : BIEN ÊTRE DES CANARDS

GRILLES D'EVALUATION DES
CANARDS PRETS A GAVER (à partir
de 63 jours d'âge) :

- emplumement ventral
- emplumement dorsal
- lésions tarsiennes
- pododermatites



PALMIPOLÉ



Ne pas oublier l'infirmierie

L'infirmierie est un élément de la démarche PalmiGConfiance : « Isoler les animaux affaiblis permet de leur apporter les soins nécessaires à leur rétablissement ».



Infirmierie

Dédiée à l'unité de production : ne mélange pas les bandes

Eau, aliment et litière propre doivent être à disposition

n'est pas un mouvoir, l'objectif est de sortir les animaux d'isolement dès que possible

pour les animaux faibles et blessés, la décision de la mise à mort compassionnelle doit être prise rapidement (éviter la souffrance inutile)

De plus, un suivi de la mortalité du lot est nécessaire. Si le taux de mortalité dépasse celui des bandes habituelles, il faut mobiliser le vétérinaire au plus tôt.



La litière et les fientes

Contrôler la température de la litière à l'entrée du bâtiment en mettant la main par terre :
LA LITIERE NE DOIT PAS SEMBLER FROIDE

Afin de travailler la litière, visiter **fré-
quemment** les bâtiments permet le dé-
placement régulier des animaux.

Le canard régulant sa température par les pattes, une litière froide peut leur créer des problèmes de santé (froid, problèmes de rein). Cela rend les animaux plus sensibles aux pathogènes (coccidiose par exemple) et provoque des baisses de performance

Il existe bien 2 types de fientes chez le canard :

	Fiente intestinale	Fiente caecale Issues de la fermenta- tion bactérienne dans les caecas
Aspect normal	Bien moulée Solide Marron foncé avec une partie blanchâtre	Paraît visqueuse Liquide Couleur brune (de cara- mel à plus foncé)
Aspect anormal	Liquide Aplatie Couleur jaunâtre, ver- dâtre ou avec des traces de sang Mousseux	Dégagement d'eau au- tour Mousseuse Couleur autre que brune

illustration par les fientes de poulet :

Fientes normales



Fientes anormales



PARTENAIRES



FINANCEUR



Pour en savoir plus :
Scannez et découvrez !



CONTACT

Joanna LITT _ litt@itavi.asso.fr _ 06 46 15 72 38

www.itavi.asso.fr

