

# Journée Volailles de chair

Pacé, 7 novembre 2023



Journée organisée avec le soutien des entreprises



dsm-firmenich



**TechnoSpore®**  
Powered by *Bacillus coagulans*

**Nouveau**

**Le meilleur des deux mondes.**

**L'innovation dans la santé intestinale.**

L'efficacité de **TechnoSpore®** provient de la souche de probiotique *Bacillus coagulans* DSM 32016. Elle est spécialement sélectionnée pour favoriser la santé et les performances des animaux monogastriques. **TechnoSpore®** combine les avantages des bactéries productrices d'acide lactique et des bactéries sporulées. Faites confiance à **TechnoSpore®**, probiotique scientifiquement prouvé pour soutenir la santé et les défenses immunitaires des animaux d'élevage moderne, dans diverses conditions environnementales.

Nous contacter: [info@biochem.net](mailto:info@biochem.net)

 **Biochem**  
Feed Safety for Food Safety®

  [biochem.net](https://www.biochem.net)

## Journée Nationale des Professionnels de la volaille de chair 2023



Plan d'action vaccination influenza aviaire hautement pathogène  
*Karen BUCHER, DGAL*



Accompagnement vétérinaire de la stratégie vaccinale IAHP en France  
*Jocelyn MARGUERIE, SNGTV*



Leviers et outils de détection pour gérer *Campylobacter* en élevage de poulet de chair  
*Amélie CHASTAGNER, ITAVI*



Marchés de la volaille et évolution des comportements d'achat  
*Simon FOURDIN, ITAVI*



Quelles améliorations possible en faveur du bien-être des poulets de chair standard ?  
*Laura WARIN, ITAVI*



# Journée Nationale des Professionnels de la volaille de chair 2023



Défi du renouvellement des générations

*Aymeric LE LAY, ITAVI*



Caractérisation physico-chimique des eaux de lavage en poulet de chair et modes de gestion.

*Solenn FASSION, CRAPL, Stéphane ROFFI CRAB*



CAP'2ER Volailles : un outil pour connaître son empreinte environnementale

*Enora CARON, ITAVI*



# Journée Nationale des Professionnels de la volaille de chair 2023



**Plan d'action vaccination influenza aviaire hautement pathogène**

*Karen BUCHER, DGAL*





**MINISTÈRE  
DE L'AGRICULTURE  
ET DE LA SOUVERAINETÉ  
ALIMENTAIRE**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

# **STRATÉGIE DE VACCINATION CONTRE L'INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE EN FRANCE**

---



**MINISTÈRE  
DE L'AGRICULTURE  
ET DE LA SOUVERAINETÉ  
ALIMENTAIRE**


*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

## **PLAN D'ACTION VACCINATION IAHP**

---

## Objectif : Définir une stratégie de vaccination IAHP en France


### 5 axes de travail




3



## VERS UNE STRATEGIE VACCINALE



## VERS LA CAMPAGNE DE VACCINATION



Direction Générale de l'Alimentation

5

## PLAN DE VACCINATION OFFICIEL EN APPLICATION DU RÉGLEMENT (UE) 2023/361

6

# Plan de vaccination officiel

## Sommaire

10 fiches en version FR et EN

1. Une brève justification de la vaccination
2. Réalisation d'une expérimentation de vaccination des canards mulards en élevage
3. La stratégie de vaccination choisie et les raisons de ce choix
4. Présentation du vaccin utilisé
5. Description de la surveillance
6. Mesures de biosécurité
7. Système d'enregistrement des données
8. Restrictions applicables aux mouvements des animaux vaccinés et de leurs produits
9. Gestion des foyers dans un contexte vaccinal
10. Campagne de communication pour informer les opérateurs et le public

<https://agriculture.gouv.fr/tout-ce-qu'il-faut-savoir-sur-le-plan-d'action-vaccination-iahp-en-france>

Intitulé de la direction/service interministérielle

7

XX/XX/XXXX

## Les principaux objectifs et cibles de la stratégie de vaccination

### Stratégie

- Vaccination préventive

### Espèce

- Canards (Barbarie, mulard et Pékin)

### Zone

- Tout le territoire métropolitain (sauf Corse)

### Période

- Toute l'année, à compter d'octobre 2023

## Une vaccination encadrée réglementairement

| Espèce         | Etage production        | Etage reproduction                                                                                                                                                      |
|----------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Canards        | Vaccination obligatoire | Vaccination interdite pour les canards reproducteurs dont les produits (œufs à couvrir et canetons d'un jour) sont exportés vers un autre Etat Membre et les pays tiers |
| Gallus         | Vaccination interdite   | Vaccination interdite                                                                                                                                                   |
| Autres espèces | Vaccination interdite   | Vaccination interdite                                                                                                                                                   |

## Cartographie de la campagne vaccinale

**64  
millions**

Nombre de  
canards




**2700**

Nombre  
d'élevages



Nombre d'établissements détenant des canards par département



## Vaccin utilisé

### Le vaccin utilisé doit :

- Etre efficace sur la souche IAHP clade 2.3.4.4.b
- Disposer d'une capacité de stratégie DIVA par sérologie ELISA NP
- Disposer d'une autorisation d'utilisation délivrée par l'ANMV (agence nationale du médicament vétérinaire)  
= > <https://www.anses.fr/fr/content/médicaments>

### Premier appel d'offre pour une commande initiale de vaccins : 80 millions de doses

== > Vaccin retenu : VOLVAC B.E.S.T de Boehringer Ingelheim

| Vaccin/fabricant                          | Espèce(s) de destination                                     | Voie d'administration | Nombre d'injections en primovaccination                                                               | Conservation du vaccin | Durée de conservation | DIVA Sérologie ELISA NP |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Volvac BEST AI+ND<br>BOEHRINGER INGELHEIM | Poule<br>Canard Pékin<br>Canard de Barbarie<br>Canard mulard | SC                    | Poule : 1<br>Canard Barbarie, mulard : 2<br>(à partir de 10j)<br>Canard Pékin : 2<br>(à partir de 1j) | +5°C                   | 24 mois               | OUI                     |

### Lancement en octobre d'un deuxième appel d'offre : 60 millions de doses

## Surveillance renforcée post-vaccination

| Modalités             | Surveillance passive renforcée                                               | Surveillance active                                                                                           |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Où ?                  | Unité épidémiologique                                                        |                                                                                                               |
| Qui ?                 | Eleveur ou Technicien                                                        | Vétérinaire sanitaire mandaté                                                                                 |
| Fréquence ?           | Hebdomadaire                                                                 | Tous les 30 jours : analyse virologique<br>En fin de lot : analyse sérologique                                |
| Comment ?             | Ecouvillons (ET/EOP) sur 5 cadavres                                          | Tous les 30 jours : écouvillons (ET/EOP) sur 60 animaux<br>et<br>En fin de lot : prise de sang sur 20 animaux |
| Analyse ?             | Virologie par RT-PCR temps réel gène M. Si résultat positif, screening H5/H7 | Virologie par RT-PCR temps réel gène M (Si résultat positif, screening H5/H7)<br>et<br>Sérologie par ELISA NP |
| Type de laboratoire ? | Laboratoire reconnu                                                          | Laboratoire agréé                                                                                             |

## Système d'enregistrement des données



### CALYPSO

- Pour collecter les données relatives aux **vaccins** et aux interventions réalisées par le **vétérinaire** ou sous sa supervision : **vaccination et visite mensuelle**.



### SIGAL

- Pour collecter les données relatives à la surveillance : **résultats d'analyse des laboratoires**



### CARTOGIP

- Pour regrouper les données mouvements déclarés par l'opérateur et les données relatives à la vaccination issues de Calypso et ainsi assurer la **traçabilité des animaux vaccinés**

## Communication

### Cibles

- Les éleveurs
- Les filières professionnelles
- Les partenaires commerciaux
- Les services de l'Etat
- La presse et le grand public

### Diffusion

- Réunions nationales
- Réunions locales
- Communiqués de presse
- Site internet du Ministère


### Outils

- Fiches opérationnelles pour les acteurs de terrain
- Instruction technique pour les services d'inspection
- Informations export sur EXPADON
- Autres supports de communication (flyer, FAQ, etc)

## Site internet du Ministère de l'Agriculture

Tout ce qu'il faut savoir sur le plan d'action vaccination influenza  
aviaire hautement pathogène en France

(en Français et en Anglais)



## Coût et prise en charge de la campagne de vaccination

### Coût :

- Le montant de la campagne est estimé à environ 100 M€ pour 12 mois.

### Prise en charge

- Financement de la campagne de vaccination 2023-2024 par l'Etat à hauteur de 85%.

Merci pour votre attention



Direction Générale de l'Alimentation

## Journée Nationale des Professionnels de la volaille de chair 2023




Accompagnement vétérinaire de la stratégie vaccinale  
IAHP en France

*Jocelyn MARGUERIE, SNGTV*




# Accompagnement vétérinaire de la stratégie vaccinale IAHP en France.



Jocelyn MARGUERIE – Commission Aviaire SNGTV




**sngtv**  
SOCIÉTÉ NATIONALE DES  
GROUPEMENTS TECHNIQUES  
VÉTÉRINAIRES



**sngtv**







## Dose





## Température du vaccin : 20 – 30° C




## Geste et lieu d'injection






# Écouvillons oro-pharyngés



# Fiches opérationnelles SNGTV



## Journée Nationale des Professionnels de la volaille de chair 2023



Leviers et outils de détection pour gérer Campylobacter en élevage de poulet de chair

Amélie CHASTAGNER, ITAVI





**ITAVI**

L'INSTITUT TECHNIQUE DES FILIÈRES  
AVICOLE, CUNICOLE ET PISCICOLE


# Leviers et outils de détection pour gérer *Campylobacter* en volailles de chair

Journée I AVI Volailles de Chair

CHASTAGNER Amélie – 07 novembre 2023



## Qu'est-ce que *Campylobacter* ?



Principales espèces : *C. jejuni* et *C. coli* responsables des IAC

Bactérie Gram -

Taille : 0,5 - 5 µm de long

Forme spiralée fortement mobile - 2 flagelles polaires  
Ne forme pas de spore

Multiplication : 30-40°C et pH 6-8


Point faible : congélation cuisson

Lieu de résidence : système digestif de vertébrés

IAE : bovins, porcs, petits ruminants, chien et chat



# Pourquoi est-ce un problème ?




ère cause de toxi-infection alimentaire d'origine bactérienne en E

Elevage point d'entrée principal de *Campylobacter* dans la filière  
 ↳ le portage de 3 log<sub>0</sub> l'abattage ↳ de 0 des risques de IAC EFSA,

⇒ En eu critique pour la filière avicole

# Quelles sont les moyens de lutte connu ?



L'addition de ces moyens de prévention réduit la prévalence de campylobacter mais aucun ne l'élimine 00

# Comment gérer Campylobacter en élevage ?


- ✓ Mettre en place les mesures de préventions sanitaires
- ✓ Bien maîtriser commence par bien détecter
  - Pour savoir si un lot est infecté et quand
  - Pour réadapter les mesures de nettoyage et désinfection
  - Pour essayer de d'identifier la source de l'infection



## Quelles sont les techniques de détection proposées au ourd'hui ?


### Culture bactérienne

Mise en culture : bactéries vivantes sélectionnées par le milieu de culture



### PCR

Extraction AD de toutes les bactéries vivantes et mortes



# Avantages    inconvénients de chacune

|                       | Bactériologie<br>(culture bactérienne)                                                                                                                                                                                                                                                                                | Biologie moléculaire<br>(PCR en temps réel)                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prélèvements          | Fientes fraîches ou (pédi-)chiffonnettes                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fientes fraîches ou (pédi-)chiffonnettes                                                                                                                                                                                                           |
| Transport et stockage | <p>Maintenir l'échantillon entre 1°C et 8 °C<br/>≤ 0 °C la bactérie meurt<br/>&gt; 15°C la bactérie se réplique<br/>= le dénombrement est faussé</p>  <p>Envoi du prélèvement sous 24h<br/>(généralement avant le mercredi soir)</p> | <p>Maintenir l'échantillon &lt; 8°C de préférence</p>  <p>Possibilité de stocker au congélateur avant envoi</p> <p>Pas de délai max pour la période d'envoi</p> |
| Résultats             | <p>Résultats sous 5 jours</p> <p>Dénombrement plus précis, mesure les bactéries vivantes</p>                                                                                                                                                                                                                          | <p>Résultats sous 24 h</p> <p>Quantifie l'ADN des bactéries vivantes et mortes</p>                                                                                                                                                                 |

## Méthodes PCR sur pédichiffonnettes : résultat de l'étude DECAMP

**objectif**  
Valider une méthode de dépistage de *Campylobacter* rapide et facile    mettre en œuvre en routine dans les élevages de poulet

### Méthodes testées

**Culture bactérienne**  
partir de fientes caecales

Fientes caecales collectées    vue en même temps que les pédichiffonnettes  
pool de 10 fientes




**PCR**  
sur pédichiffonnettes

Pédichiffonnettes réparties sur l'ensemble du bétail  
pédichiffonnettes poolées par bétail.



**?**  
30 lots de poulet de chair standard dans la semaine précédant l'abattage

# Méthodes PCR sur pédichiffonnettes : résultat de l'étude DECAMP



bonne corrélation entre les dénombrement par culture bactérienne et les PCR

Les protocoles PCR ne sont pas encore standardisés entre les laboratoires donc les valeurs de quantification peuvent varier

La méthode PCR est idéale pour la détection car facilite le prélèvement et les résultats sont plus rapides

## Conclusion

Campylobacter n'est pas pathogène pour les volailles  
mais <sup>er</sup> responsable de IAC en Europe

Aucun indicateur visible de sa présence en élevage  
→ 2 méthodes de détections disponibles culture bactérienne PCR

Des moyens de préventions identifiés mais pas 100% efficace

nécessite de continuer les recherches afin de trouver des leviers pour éliminer définitivement Campylobacter de nos élevages

Merci de votre attention

Et merci aux financeurs



et aux participants de l'étude DECAMP



*Pour toutes questions contacter : [chastagner@itavi.asso.fr](mailto:chastagner@itavi.asso.fr)*

11



Journée Volailles de Chair Pacé Nov 2023



## Journée Nationale des Professionnels de la volaille de chair 2023



Marchés de la volaille et évolution des comportements  
d'achat

*Simon FOURDIN, ITAVI*





**ITAVI**

L'INSTITUT TECHNIQUE DES FILIÈRES  
AVICOLE, CUNICOLE ET PISCICOLE

# Marchés de la volaille et évolution des comportements d'achat

## Journée ITAVI – Volaille de Chair

Simon Fourdin & Mohamed Bouzidi – 7 novembre 2023




## Cours des matières premières

*2023 : Détente avec une forte volatilité... tensions sur les céréales en mer Noire ... fondamentaux favorables... récoltes records au Brésil*


### Blé fourrager rendu Ile-et-Vilaine

majorations incluses



### Maïs rendu Ile-et-Vilaine


majorations incluses




# Cours des matières premières

la progression de l'huile et la demande du débouché biocarburant maintiennent les cours

Tourteau de soja départ Montoir



Tourteau de tournesol départ St. Nazaire



Source : La Dépêche


3



Journée ITAVI de la volaille de Chair – 7 novembre 2023



## Evolution des indices matières premières ITAVI



4




Journée ITAVI de la volaille de Chair – 7 novembre 2023



# Evolution des autres charges

## Evolution des indices IPAMPA des principaux postes de coûts



5




Journée ITAVI de la volaille de Chair – 7 novembre 2023



## La consommation de volaille en UE

prévision en hausse dans la plupart des pays en 2023 (effet IAHP en 2022)

La France 1<sup>er</sup> pays consommateur de volaille en Europe (conso/habitant x nombre d'habitants)



Source : ITAVI d'après Eurostat et sources nationales

\* estimations,

6



Journée ITAVI de la volaille de Chair – 7 novembre 2023






# La consommation de volaille par circuit


Le secteur RHD progresse au profit des imports en 2023\*

Comparaison de l'évolution de la consommation totale et à domicile de viande de volailles



Source : ITAVI d'après Agreste, Kantar Wordl Panel pour FranceAgriMer

Poids de la consommation de volailles par circuit




\* estimations,



# France - La consommation de volaille par espèce et type

2023 : le poulet continue son ascension, désormais 4/5 de la volaille consommée en France est du poulet

Segmentations des achats des ménages par espèces de volaille (hors élaborés, abats, surgelés)



Source : ITAVI d'après Kantar World Panel pour FranceAgriMer

\* estimations,






## La consommation de poulet par type d'achat

2023 : La part des élaborés et charcuterie reculent pour la première fois (inflation)...  
stabilisation des achats en entier et croissance des découpes (cuisses & filet)

### Répartition des achats de poulet par type



Source : ITAVI d'après Kantar pour FranceAgriMer

\* estimations,

9




Journée ITAVI de la volaille de Chair – 7 novembre 2023



## France | La volaille (œufs et poulet), les protéines animales les plus abordables

Prix vente consommateur des principaux produits d'origine animale Aout 2023 en €/ kg produit

(evol prix % aout 23/22)



La viande de volaille (poulet) se trouve en deuxième position derrière les œufs en terme de protéines animales les plus abordables.

Source : Itavi d'après Kantar World Panel pour FranceAgriMer

10




Journée ITAVI de la volaille de Chair – 7 novembre 2023





## Evolution des abattages de viande de volailles par espèce UE-27



Le poulet progresse à nouveau après une baisse conjoncturelle en 2022, il tire la production de volaille en Europe. La dinde continue de décroître (après une année 2022 également compliquée).

Source : ITAVI d'après Eurostat, sources nationales

11



Journée ITAVI de la volaille de Chair – 7 novembre 2023




MMB4



## Abattages de volailles - France

Redressement des abattages depuis mai, mais impact IAHP sur les 1ers mois 2023

### Evolution des abattages de volaille en 2023 par rapport à 2022



| téc             | Mois de juillet |         |        | Cumul 8 mois |         |        |
|-----------------|-----------------|---------|--------|--------------|---------|--------|
|                 | 2022            | 2023    | %23/22 | 2022         | 2023    | %23/22 |
| Poulets         | 88 814          | 92 637  | 4,3%   | 706 480      | 724 196 | 2,5%   |
| Poules et coqs  | 2 570           | 3 114   | 21,2%  | 22 941       | 22 938  | 0,0%   |
| Dinde           | 16 628          | 19 431  | 16,9%  | 159 799      | 148 308 | -7,2%  |
| Canards à rôtir | 3 188           | 5 484   | 72,0%  | 36 069       | 32 407  | -10,2% |
| Canards gras    | 6 079           | 6 001   | -1,3%  | 34 875       | 42 965  | 23,2%  |
| Pintade         | 1 423           | 1 886   | 32,5%  | 12 420       | 13 122  | 5,7%   |
| Total volailles | 118 719         | 128 579 | 8,3%   | 972 793      | 984 325 | 1,2%   |

Source : ITAVI d'après SSP

12



Journée ITAVI de la volaille de Chair – 7 novembre 2023






# France | ralentissement de la production SIQO

L'inflation pénalise le bio, stabilisation MMB1 MMB3

## Évolution des MEP poulet Bio

(- 25% 22/21 | -14% 9P 23/22; -36% sur 2 ans)

Mises en place de poulets Bio en filières organisées




Source : ITAVI d'après Synalaf

## Évolution des MEP poulet LR

(- 9% 22/21 | -3% 9P 23/22; -10% sur 2 ans)

Mises en place de poulets Label Rouge




MMB2

# France | Échanges volailles - 8M 2023


Hausse des imports et chute des exports

## Exportations françaises de viande de poulet. 8M 2023 : -17 %



■ 8 mois 2022 ■ 8 mois 2023

## Importations françaises de viande de poulet. 8M 2023 : +3,4% (+8,5% depuis l'UE)




■ 8 mois 2022 ■ 8 mois 2023

Source : ITAVI d'après Douanes françaises



## La part du poulet importé dans la consommation

Le rapport import/consommation devrait reculer légèrement en 2023



Source: Itavi d'après SSP, douanes  
\*\* projections

15




Journée ITAVI de la volaille de Chair – 7 novembre 2023



## Le taux d'auto-approvisionnement en France en forte dégradation en 2023

Rapport production/consommation



Source: Itavi d'après SSP, douanes

Pour la première fois le taux d'auto-approvisionnement en dinde et canard risque de plonger sous les 100% en 2023 → baisse de la production et progression des imports

16



Journée ITAVI de la volaille de Chair – 7 novembre 2023






## UE - Importations records de poulet depuis les pays tiers (+9% 6M 23/22; +17% 22/21)

La suppression des droits de douane pour l'Ukraine stimule les imports (+70%/S1 22).. +227 % sur 2 ans (+85K téc)

### Importations de l'UE depuis pays tiers en viande de poulet 6M 23/22



Source : ITAVI d'après TDM

17



Journée ITAVI de la volaille de Chair – 7 novembre 2023



## Conclusion

- Une certaine « détente » sur les matières premières et sur l'énergie après une année 2022 de tous les records
- Une inflation qui impacte la consommation mais deux filières sont toujours à la hausse (poulet en VdC et aussi œufs)
- Encore des effets de l'IAHP sur la production (avec des espèces plus touchées que d'autres)
- Des points forts : France le premier pays en consommation de volaille de chair, une production « retrouvée »...
- Des points d'attention : deux espèces qui vont passer en 2023 sous le seuil d'auto-approvisionnement (dinde et canard), la « déconsommation » sur certaines espèces et le niveau global des importations



18



Journée ITAVI de la volaille de Chair – 7 novembre 2023





# ITAVI

L'INSTITUT TECHNIQUE DES FILIÈRES  
AVICOLE, CUNICOLE ET PISCICOLE

## Merci de votre attention !

Retrouvez nos analyses et publications sur [www.itavi.asso.fr](http://www.itavi.asso.fr)

Contact : [fourdin@itavi.asso.fr](mailto:fourdin@itavi.asso.fr)



## Journée Nationale des Professionnels de la volaille de chair 2023



# ITAVI

Journée Nationale



Quelles améliorations possible en faveur du bien-être des  
poulets de chair standard ?

*Laura WARIN, ITAVI*



## Quelles améliorations possibles en faveur du bien-être des poulets de chair standard ?

[Laura Marin](#) Auriane Foreau - ITAVI




## La prise en compte du bien-être animal en élevage évolue au fil du temps





## A out de Lumière naturelle

Où en est-on actuellement en France ?



Engagement de la filière ANV L : des poulaillers standards avec fenêtres d'ici 2022

- Fenêtres ajoutées dans de nombreux bâtiments quand cela est possible
- Fenêtres intégrées aux nouveaux bâtiments construits

Surface en vitrage : 10% de la surface utile du poulailler 100 m<sup>2</sup> de vitrage pour un bâtiment de 1000 m<sup>2</sup>

- Correspond aux niveaux A et D de l'étiquetage bien-être animal
- Correspond aux exigences ECC

3



## A out de Lumière naturelle

Quelles implications ?



Augmentation de l'activité  
→ amélioration de la qualité de la litière  
Rythme jour/nuit naturel




Amélioration des conditions  
de travail  
Mais attention à la gestion



Privilégier du double vitrage  
isolation thermique



Coûts en rénovation :  
≈ 20 m<sup>2</sup> de surface utile  
soit 30 000 € pendant 2 ans



L'ajout de fenêtres est une solution déjà adoptée sur le terrain pertinente pour améliorer le bien-être des poulets et le confort de travail des éleveurs. Accessible d'un point de vue technique et économique pour les bâtiments neufs la faisabilité en cas de rénovation doit être discutée au cas par cas.

4



## A out d'enrichissements



Où en est-on actuellement en France ?

m de plateforme pour poulets  
tiquetage bien-être niveau C et D



cordelettes pour poulets  
2 ob ets piquer pour poulets  
tiquetage bien-être niveau C et D



Enrichissements mis en place dans certains élevages  
pour répondre divers besoins comportementaux et  
améliorer le bien-être des poulets

De nombreux équipements peuvent être utilisés

5



## A out d'enrichissements



Quelles implications ?



Qualité de repos améliorée  
zone sécurisée  
↗ de l'activité ↗ de l'exploration  
Environnement de vie plus stimulant



↗ temps de travail et  
pénibilité  
↗ fierté amélioration image  
renvoyée



Attention au choix des matériaux :  
quid de la durabilité dans le temps et  
ou des processus de recyclage ?  
↗ conso eau pour nettoyer enrich.



Co ts variables :  
locs picorer ≈ 0,15 m pour lot  
Plateformes ≈ 1,17 m



Les enrichissements stimulant les comportements de perchage d'exploration  
et de bain de poussière sont pertinents pour améliorer le bien-être des  
poulets et accessibles d'un point de vue technique et économique

Les combiner permet de complexifier l'environnement de vie et de  
répondre plusieurs besoins comportementaux simultanément


6



## Réduction des densités



Où en est-on aujourd'hui en France ?



La réglementation européenne limite la densité  $3 \text{ g m}^2$  mais  
deux dérogations sont possibles  $3 \text{ g m}^2$  et  $2 \text{ g m}^2$   
mais l'ECC demande une densité max de  $30 \text{ g m}^2$   
soit 30 par rapport au max réglementaire

7



## Réduction des densités



Quelles implications ?



Moins de dérangements  
↑ de l'activité  
Moindre dégradation de la litière  
Moins de risque de coups de chaleur



Peu de différences



↑ conso chauffage  
↓ rejets N



↓ productivité : -23 %  
en passant de 30 à 3  $\text{g m}^2$




La réduction des densités de  $30 \text{ g m}^2$  à  $3 \text{ g m}^2$  est  
pertinente pour améliorer le bien-être des poulets mais  
engendre un surcoût non négligeable

8



## Changement de souche

Où en est-on aujourd'hui en France ?



La réglementation européenne n'impose aucune limite au rythme de croissance

En France le Ross est traditionnellement élevé  
De nouvelles souches à croissance intermédiaire  
se développent. Elles sont en lien avec l'ECC

Les souches se distinguent par leur vitesse de croissance  
Pour atteindre un même poids cible de 2 kg il y a 7 jours d'écart entre le Ross et la Redbro




9



## Changement de souche

• Les implications



↑ de l'activité  
→ moindre dégradation de la litière  
Moins de risque de coups de chaleur  
Démarche améliorée



Conditions de travail plus agréables  
↓ stress, moins de rotation, animaux plus sains



↑ consommation chauffage et eau  
↑ occupation des sols  
↑ rejets N (moins d'efficacité)



↑ coût de production de  
↓ productivité : - 2 points annuels  
en passant du Ross à la Redbro




La transition vers des souches à croissance plus lente que le poulet Ross 30 est pertinente pour améliorer le bien-être des poulets et améliorer les conditions de travail des éleveurs mais engendre un surcoût important

10



## Installation de véranda

- **en est on actuelle ent en rance**



**Surface supplémentaire** attenante au bâtiment d'élevage à laquelle les poulets peuvent accéder grâce aux trappes

Cet espace représente **au moins 20 %** de la surface du bâtiment  
Les poulets y accèdent généralement à partir d'une vingtaine de jours

11



## Installation de véranda

- **ue es i ications**



Laisse le choix aux poulets entre 2 environnements ≠  
Stimulerait l'activité → peu de données scientifiques




↗ temps de travail  
↗ satisfaction



↗ conso chauffage et eau (lavage veranda)



**Coûts très élevés**  
≈ 250 / m de jardin d'hiver  
oit pour m a ec m e  
ar in hi er



L'ajout de véranda semble **pertinent pour améliorer le bien-être des poulets** mais **des connaissances restent à acquérir** e utilisation en période hivernale

**Coût élevé pour une utilisation sur une courte période + une ventilation à adapter** pour ne pas dégrader l'ambiance du bâtiment.

12





## Conclusion

Considérer le bien- tre des poulets est un défi complexe qui a des conséquences sur le travail de l'éleveur le coût de production et les impacts environnementaux

➔ **Les évolutions en faveur du bien- tre doivent aussi trouver leur marché**

Pour aller plus loin retrouve nos fiches techniques sur le site [itavi.asso.fr](http://itavi.asso.fr)  
Contact : [arin@itavi.asso.fr](mailto:arin@itavi.asso.fr)





## Blancs de poulets & blancs cheveux ?

Matériel et méthode : le recensement agricole

Quelques enseignements du recensement agricole :

- ☐ Exploitations d'élevages
- ☐ Âge des agriculteurs
- ☐ Âge des aviculteurs
- ☐ Âge des éleveurs de volailles de chair
- ☐ Nombre d'exploitants de volailles de chair par production
- ☐ Devenir de l'exploitation de volailles de chair selon âge des exploitants

Aymeric LE LAY – Simon FOURDIN



Journée Volailles de chair | Pacé | 07.11.2023

## Matériel et méthode : le recensement agricole

- Entre octobre 2020 et mai 2021
- Modalités de collecte : internet, téléphone, présentiel
- Agriculteurs :
  - Chef d'exploitation et co-exploitants
    - Pas de distinctions par atelier
- 1292 variables au total
  - Concernant les volailles :
    - 82 tronc commun
      - + 35 en échantillon (bâtiment et effluents)




# Exploitations avec élevages

...de poulets blancs (et autres volailles de chair)

**De moins en moins d'exploitations d'élevages :  
-30% tous les 10 ans**

## De moins en moins d'exploitations d'élevages : -30% tous les 10 ans




Source : SSP, RA 2020 2010 et 2000, traitement IFIP Christine Roguet

Journée Volailles de chair | Pacé | 07.11.2023



## De moins en moins d'exploitations d'élevages : -30% tous les 10 ans




Part des exploitations ayant de l'élevage :  
de 69% en 2000 à **51% en 2020**

Source : SSP, RA 2020 2010 et 2000, traitement IFIP Christine Roguet

Journée Volailles de chair | Pacé | 07.11.2023



## De moins en moins d'exploitations d'élevages : -30% tous les 10 ans



Part des exploitations ayant de l'élevage :  
de 69% en 2000 à **51% en 2020**

**Granivores** sans activité herbivore significative

**Mixtes** granivores et herbivores

**Herbivores** sans activité granivore significative


**Elevages de taille non significative**

Source : SSP, RA 2020 2010 et 2000, traitement IFIP Christine Roguet

Journée Volailles de chair | Pacé | 07.11.2023



## De moins en moins d'exploitations d'élevages : -30% tous les 10 ans



Part des exploitations ayant de l'élevage :  
de 69% en 2000 à **51% en 2020**

**Granivores** sans activité herbivore significative

**Mixtes** granivores et herbivores

**Herbivores** sans activité granivore significative


**Elevages de taille non significative**

Source : SSP, RA 2020 2010 et 2000, traitement IFIP Christine Roguet

Journée Volailles de chair | Pacé | 07.11.2023



## De moins en moins d'exploitations d'élevages : -30% tous les 10 ans



Part des exploitations ayant de l'élevage :  
de 69% en 2000 à 51% en 2020

**Granivores** sans activité herbivore significative

**Mixtes** granivores et herbivores

**Herbivores** sans activité granivore significative

**Elevages de taille non significative**

Source : SSP, RA 2020 2010 et 2000, traitement IFIP Christine Roguet

9




Journée Volailles de chair | Pacé | 07.11.2023



## De moins en moins d'exploitation de VdC : -18% tous les 10 ans


Evolution du nombre d'exploitations de volailles de chair



**29k**  
**Dont 14k de Volailles de chair (VdC)** ← **Exploitations**  
Poulet, Dinde, Pintade, Canard à rôti, Oie, Caille, Pigeon

Nombre d'exploitations de VdC en 2020

Ne produisant pas de poulets; 32%



Produisant du poulet; 68%

**Granivores** sans activité herbivore significative

**Mixtes** granivores et herbivores

**Herbivores** sans activité granivore significative

**Elevages de taille non significative**

Source : SSP, RA 2020 2010 et 2000, traitement IFIP Christine Roguet

10




Journée Volailles de chair | Pacé | 07.11.2023




# Elevage de poulet : répartition & concentration

Répartition des élevages de poulets par départements



Autant d'exploitations dans le **cercle** qu'en dehors

Répartition des emplacements de poulets et du nombre d'ateliers selon la taille des ateliers de poulet de chair




## Démographie

Blancs cheveux ?  
Oui quand même un peu


# Un population agricole âgée

490k exploitants et co-exploitants  
pour 380k exploitations

Pyramide des âges de la population française (Hexagone)



Pyramide des âges des agriculteurs



13




Journée Volailles de chair | Pacé | 07.11.2023




# Des éleveurs de VdC âgés (mais un peu moins)

Agriculteurs (Métropole)



17k exploitants et co-exploitants  
pour 13k exploitations

Éleveurs de VdC



14



Journée Volailles de chair | Pacé | 07.11.2023



## Volailles de chair : part des +60 ans parmi les exploitants et co-exploitants par production

| Espèce                   | Effectif total exploitants et co-exploitants |
|--------------------------|----------------------------------------------|
| Poulets de chair et coqs | 13 612                                       |
| Dindes et dindons        | 2 770                                        |
| Pintades                 | 2 118                                        |
| Canards à rôtir          | 1 278                                        |
| Pigeons                  | 168                                          |
| Cailles                  | 148                                          |
| Oies à rôtir             | 69                                           |



La part des + de 60 ans est variable selon les productions



À l'exception du canard, les éleveurs bio sont significativement plus jeunes



## Volailles de chair : nombre d'exploitants par exploitation par production

| Espèce                   | Effectif total exploitants et co-exploitants |
|--------------------------|----------------------------------------------|
| Poulets de chair et coqs | 13 612                                       |
| Dindes et dindons        | 2 770                                        |
| Pintades                 | 2 118                                        |
| Canards à rôtir          | 1 278                                        |
| Pigeons                  | 168                                          |
| Cailles                  | 148                                          |
| Oies à rôtir             | 69                                           |



61 % des exploitations de volailles de chair ont un seul exploitant



L'âge moyen des exploitants de volailles de chair est de 47 ans



## Que vont devenir les exploitations de Poulets dont les éleveurs ont plus de 60 ans ?

8.5

Devenir de l'exploitation dans les 3 prochaines années dans le cas où le chef d'exploitation, ou le plus âgé des exploitants, a plus de 60 ans

17




Journée Volailles de chair | Pacé | 07.11.2023



## Que vont devenir les exploitations de Poulets dont les éleveurs ont plus de 60 ans ?

8.5

Devenir de l'exploitation dans les 3 prochaines années dans le cas où le chef d'exploitation, ou le plus âgé des exploitants, a plus de 60 ans



18



Journée Volailles de chair | Pacé | 07.11.2023



## Qu'en conclure ?

- ➡ % agriculteurs / population générale
- ➡ % éleveurs / population agricole décroît
- ➡ % éleveurs de VdC / éleveurs
- ➡ % éleveurs de poulets / éleveurs de VdC

- 11% des éleveurs de poulets ont plus de 60 ans
  - Retrouvés dans 942 exploitations
  - Si ensemble des exploitants 60+ ans → Incertitude
    - Transmission ou abandon des ateliers ?
- Future question au RA2030 : « Aviez-vous de l'élevage ? » ?



## Merci pour votre attention !



# Journée Nationale des Professionnels de la volaille de chair 2023



## Caractérisation physico-chimique des eaux de lavage en poulet de chair et modes de gestion.

*Solenn FASSION, CRAPL, Stéphane ROFFI CRAB*



## GEST'OLAV


Caractérisation quantitative et qualitative des eaux de lavage en poulets de chair



[pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr](http://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr)



# **L'eau en aviculture : enjeux et projets sur l'eau**



## **Contexte**



# ➤ Enjeux et objectifs du projet Gest'olav

## Volet Quantitatif

- Nouvelles données de consommation d'eau de lavage
- Etude des pratiques
- Aide au dimensionnement des ouvrages de stockage

## Volet Qualitatif

- Caractérisation des eaux de lavage
- Conseils pour améliorer la qualité des eaux de lavage stockées



**Enquêtes sur les pratiques de lavage**

**Préconisations sur le dimensionnement  
des ouvrages**

## Objectifs des enquêtes

1) Nouveaux repères sur les consommations moyennes d'eau de lavage (à dire d'éleveurs)




Crédit : Journal paysan breton




2) Identification des consommations d'eau en fonction des pratiques et bâtiments

3) Fournir un premier conseil de dimensionnement des ouvrages de stockage





## PRÉSENTATION DE L'ENQUÊTE



## PRÉSENTATION DE L'ÉCHANTILLON

- 73 retours d'enquêtes
- 56 bâtiments de volailles de chair

- Majoritairement volailles de chair



## Quelques repères de consommation d'eau

| Production                        | Moyenne poulet |      | Moyenne dinde |
|-----------------------------------|----------------|------|---------------|
| Année                             | 2022           | 2012 | 2022          |
| n échantillon                     | 33             | 4    | 11            |
| Surface moyenne (m <sup>2</sup> ) | 1264           | 1625 | 1002          |
| Conso eau L/m <sup>2</sup> /h     | 1,2            | 0,6  | 0,9           |
| Conso eau (L/m <sup>2</sup> /lot) | 7,9            | 2,4  | 11,5          |

## Impact des pratiques sur les consommations d'eau

### ➤ Pratiques étudiées



Type de ventilation




Type de sol



Utilisation du détergent



Utilisation d'eau chaude



Moment de retrait de la litière



Origine de l'eau



Pression du nettoyeur



Réalisation d'un pré-trempe





Faire appel à un prestataire

Crédit : les fermes du loir




## Impact du type de sol

- Type de sol : consommation d'eau plus importante sur sol béton



Bâtiment sol béton




Bâtiment sol terre battue

- Surface lavée
- Surface non lavée




## L'utilisation du détergent

- L'utilisation de détergent semble entraîner une moindre consommation d'eau



## Influence de l'utilisation du détergent suivant le type de sol sur la consommation d'eau



## ▲ Ouvrage de stockage et dimensionnement

### Conseil de dimensionnement

#### Basé sur :

- 1) Retours d'expérience terrain d'éleveurs
- 2) Consommations moyennes sol béton

A considérer comme un repère pas une référence !

**1m<sup>3</sup> pour 100m<sup>2</sup> de bâtiment**

#### ➤ Exemples<sup>(1)</sup> :

1) Vidange par lot : bâtiment de 1000 m<sup>2</sup> -> Conso de 10 000 L -> Ouvrage de stockage -> 10 m<sup>3</sup>

2) Vidange annuelle<sup>(2)</sup> : bâtiment de 1000 m<sup>2</sup> -> Conso de 60 000 L à 70 000 L -> Ouvrage de stockage -> 70 m<sup>3</sup>


(1) Avec une consommation moyenne sur sol béton : 9,6L/m<sup>2</sup>, arrondi à 10L/m<sup>2</sup>/Lot

(2) Pour un bâtiment de poulets standards avec 6 - 7 lots/an

+ précipitation - évaporation (NC)  
+ marge de sécurité



## ▲ Lien avec une autre étude en cours






## Caractérisation des eaux de lavage en poulets de chair

### Quelques préconisations sur la gestion de la qualité des eaux


## Statut des eaux de lavage

### 1) Cas d'un bâtiment sur sol terre battue



**Récupération des eaux dans le fumier**  
> Pas de récupération

### 2) Cas d'un bâtiment sur sol béton sans traitement



**Collecte des eaux :**  
-> ICPE : considéré comme effluent classique


Epandage hors périodes d'interdiction

**Autres usages :**  
- Compostage

- Méthanisation

- Traitement/réutilisation

### 3) Cas d'un bâtiment sur sol béton avec traitement



**Collecte des eaux :**  
-> ICPE : considéré comme un effluent peu chargé ([NTK] < 500mg/L)


Directive nitrate : Epandage possible en période d'interdiction d'épandage\*

\*dans la limite de 20 uN efficace/ha




## Contexte


- Que fait-on des eaux de lavage ?



DEVENIR DES EAUX DE LAVAGE



## Méthodologie de prélèvement, analyses et traitement



## Analyses demandées


| Paramètres                                                         | Informations et réglementation                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Demande Chimique en Oxygène (DCO)                                  | Représente tout ce qui est susceptible de consommer de l'oxygène dans l'eau (composés organiques...)<br><b>Valeur de rejet dans le milieu naturel (ICPE) &lt; 300mg d'O<sub>2</sub>/L</b> |
| Demande Biologique en Oxygène (DBO)                                | Représente ce qui est susceptible de consommer de l'oxygène par voie biologique et rend compte de la biodégradabilité de l'effluent                                                       |
| Demandes Chimique et biologique en Oxygène filtrées (DCOf et DBOf) | Représente les parts de DCO et DBO présentes dans les fractions dissoutes et colloïdales de l'effluent                                                                                    |
| Matières en Suspension (MES)                                       | Ensemble des matières solides insolubles visibles à l'œil nu de l'effluent = partie visible de la pollution particulaire                                                                  |
| Azote total Kjeldahl (NTK)                                         | Teneur en composés azotés susceptible de consommer de l'oxygène. Renseigne la part agronomique de l'effluent<br><b>EPC &lt; 500mg/L</b>                                                   |
| P total                                                            | Teneur globale en organophosphates, phosphates condensés et formes organiques du phosphore compris dans l'effluent. Renseigne la valeur agronomique de l'effluent                         |
| Potassium (K)                                                      | Concentration en ions potassium de l'effluent. Renseigne sa valeur agronomique                                                                                                            |
| pH                                                                 | Renseigne sur la nature acide, neutre ou basique de l'effluent                                                                                                                            |



## Résultats généraux

16 échantillons réalisés, 12 exploitables


| Tableau Référence (toutes les données) |                       |                |             |            |
|----------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------|------------|
| Critères de pollution                  | Unités                | n échantillons | Moyenne     | Ecart type |
| DCO                                    | mg(O <sub>2</sub> )/L | 12             | <b>7600</b> | 4934       |
| DCO filtrée                            | mg(O <sub>2</sub> )/L | 10             | <b>1438</b> | 1021       |
| DBOn                                   | mg(O <sub>2</sub> )/L | 12             | <b>1552</b> | 1241       |
| DBO filtrée                            | mg(O <sub>2</sub> )/L | 9              | <b>708</b>  | 712        |
| MES                                    | mg/l                  | 12             | <b>5113</b> | 4280       |
| Azote Kjeldahl                         | mg (N)/L              | 12             | <b>446</b>  | 237        |
| Azote ammoniacal                       | mg (N)/L              | 12             | <b>170</b>  | 121        |
| Phosphore total                        | mg(P)/L               | 12             | <b>109</b>  | 115        |
| Potassium                              | mg/L                  | 12             | <b>371</b>  | 153        |
| pH                                     | unité pH              | 12             | <b>7</b>    | 0,5        |





A l'exception du pH, on peut observer une forte variabilité (écart type important) des résultats.



## Analyses statistiques réalisées




## Impact de la fréquence de vidange sur les MES et NTK



## Vidange au lot

- Face à ces résultats, 2 tableaux de références peuvent être données :

| Critères de pollution | Unités                | n | Moyenne     | Ecart type |
|-----------------------|-----------------------|---|-------------|------------|
| DCO                   | mg(O <sub>2</sub> )/L | 6 | <b>6217</b> | 5082       |
| DCO filtrée           | mg(O <sub>2</sub> )/L | 5 | <b>1378</b> | 484        |
| DBOn                  | mg(O <sub>2</sub> )/L | 6 | <b>1473</b> | 975        |
| DBO filtrée           | mg(O <sub>2</sub> )/L | 4 | <b>730</b>  | 243        |
| MES                   | mg/l                  | 6 | <b>3295</b> | 3279       |
| Azote Kjeldahl        | mg (N)/L              | 6 | <b>352</b>  | <b>111</b> |
| Azote ammoniacal      | mg (N)/L              | 6 | <b>161</b>  | 88         |
| Phosphore total       | mg(P)/L               | 6 | <b>61</b>   | 27         |
| Potassium             | mg/L                  | 6 | <b>335</b>  | 131        |
| pH                    | unité pH              | 6 | <b>7,1</b>  | 0,4        |




- Bon coeff  $R^2$ , la DCO évolue avec les MES.
- NTK < 500mg(N)/L

## Vidange annuelle / bisannuelle


- Face à ces résultats, 2 tableaux de références peuvent être données :

| Critères de pollution | Unités                | n | Moyenne     | Ecart type |
|-----------------------|-----------------------|---|-------------|------------|
| DCO                   | mg(O <sub>2</sub> )/L | 6 | <b>8983</b> | 4811       |
| DCO filtrée           | mg(O <sub>2</sub> )/L | 5 | <b>1498</b> | 1449       |
| DBOn                  | mg(O <sub>2</sub> )/L | 6 | <b>1630</b> | 1556       |
| DBO filtrée           | mg(O <sub>2</sub> )/L | 5 | <b>690</b>  | 984        |
| MES                   | mg/L                  | 6 | <b>6930</b> | 4650       |
| Azote Kjeldahl        | mg (N)/L              | 6 | <b>540</b>  | <b>300</b> |
| Azote ammoniacal      | mg (N)/L              | 6 | <b>179</b>  | 156        |
| Phosphore total       | mg(P)/L               | 6 | <b>156</b>  | 151        |
| Potassium             | mg/L                  | 6 | <b>407</b>  | 177        |
| pH                    | unité pH              | 6 | <b>7</b>    | 0,6        |



- Bonne cohérence entre la DCO et les MES ( $R^2$ )
- [NTK] > 500mg(N)/L

## Interprétation des résultats



## Ce qu'il faut retenir des enquêtes

- De nouvelles données sur les consommations d'eaux de lavage par espèce :




- 8 L/m² en poulets de chair
- 11,5 L/m² en dindes



- Enquêtes à dire d'éleveurs :

-> Il conviendrait par la suite de coupler ces résultats avec de nouvelles mesures terrain.



- Intérêt du détergent :

-> Cette pratique permet de réduire les consommations d'eau :


-1 à -2L/m², pour tout type de sol



- Nouveaux repères pour le dimensionnement des ouvrages de stockage :

1m³ pour 100m² de bâtiment

-> A considérer comme des repères : peut varier d'un éleveur à l'autre !



## Ce qu'il faut retenir des analyses

---

### Des qualités d'eaux très différentes

- Forte hétérogénéité
- Une concentration en N total < 500mg/L

### Fréquence de vidange de la fosse impactante

- Echantillon avec une charge polluante moins importante lors d'une vidange au lot
- Préconisation de curer le fond de la fosse lors de la vidange annuelle



**Des résultats à consolider**



**Merci de votre attention !!**

### **Article Réussir volailles :**

<https://www.reussir.fr/volailles/trois-fois-plus-deau-pour-laver-les-batiments-de-poulet-de-chair>

### **Article Le Mag des chambres d'agriculture de Bretagne :**

[https://bretagne.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user\\_upload/National/FAL\\_commun/publications/Bretagne/PDF/LeMag/MAG\\_13\\_BD.pdf](https://bretagne.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Bretagne/PDF/LeMag/MAG_13_BD.pdf)



# Journée Nationale des Professionnels de la volaille de chair 2023



CAP'2ER Volailles : un outil pour connaître son empreinte  
environnementale

*Enora CARON, ITAVI*



## CAP'2ER® Volailles

De la sensibilisation à la conception d'une  
stratégie de réduction de l'empreinte  
environnementale

07 novembre 2023



# Contexte

## Quelques éléments d'introduction

2




### Une filière avicole très attendue

#### Au niveau européen

Green Deal / Farm to fork / PAC / Directive IED ...

#### Au niveau français

Plan de relance / SNBC / PAN ...  
Conditionnalités aides



3




... signifiant :

## Calcul Automatisé des Performances Environnementales pour des Exploitations Responsables

... avec 4 grands objectifs :

- **Sensibiliser** éleveurs et conseillers
- **Évaluer** les principaux impacts environnementaux
- **Positionner** l'exploitation par rapport à une référence
- **Proposer des leviers d'action** entre pratiques d'élevages et impacts



## 2 niveaux d'évaluation possibles

| Niveaux :                              | Niveau 1                                                                            | Niveau 2                                                                              |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Objectif</i>                        | <b>Sensibilisation</b>                                                              | <b>Plan de progrès</b>                                                                |
| <i>Public</i>                          | Conseillers, Techniciens                                                            | Conseillers, Techniciens                                                              |
| <i>Échelle d'analyse</i>               | Atelier, Produits                                                                   | Exploitation, Atelier, Produits                                                       |
| <i>Données d'entrée</i>                | Environ 30                                                                          | Environ 150-300                                                                       |
| <i>Temps de réalisation diagnostic</i> | 1 heure                                                                             | ½ à 1 journée                                                                         |
| <i>Base de données</i>                 | Oui                                                                                 | Oui                                                                                   |
| <i>Certification des résultats</i>     |  |  |

## Outil CAP'2ER® : multicritère

### Des indicateurs d'impacts environnementaux



Changement  
Climatique (GES)



Consommation  
d'énergies fossiles



Qualité de l'air  
(ammoniac)



Qualité de l'eau  
(azote, phytos)

### Des indicateurs de contributions positives



Maintien de la  
biodiversité



Stockage de  
carbone



Performance  
nourricière

### Des indicateurs complémentaires

Conditions  
de travail

Performances  
économiques

6



## Outil Niveau 1


### Périmètre

7



## Périmètre de l'atelier volaille

NIVEAU 1



## Outil CAP'2ER® : multicritère

NIVEAU 1

Des indicateurs d'impacts environnementaux



Changement Climatique (GES)



Consommation d'énergies fossiles



Qualité de l'air (ammoniac)



Qualité de l'eau (azote, phytos)

Emissions d'ammoniac

Des indicateurs de contributions positives



Maintien de la biodiversité



Stockage de carbone



Performance nourricière

Des indicateurs complémentaires

Conditions de travail

Performances économiques




# Outil Niveau 1

Un exemple : Poulet LR

10



## Fonctionnement de l'outil




11




Les données d'entrée : une approche limitée

NIVEAU 1




Performances techniques d'un système de production

Consommations d'énergie de l'atelier



NIVEAU 1



# Les résultats (1)

## Contributions positives et empreinte carbone

NIVEAU 1



Présentation de l'atelier et des performances techniques

Contributions positives :

- Maintien de la biodiversité
- Stockage carbone
- Performance nourricière


14



# Les résultats (1)

## Contributions positives et empreinte carbone

NIVEAU 1



Emprise carbone nette =  
Emprise carbone brute (GES)  
- Stockage de carbone

Emissions de GES (directes et indirectes) :

- Émissions de CH<sub>4</sub>
- Émissions de N<sub>2</sub>O
- Émissions de CO<sub>2</sub>

Stockage carbone (parcours + abords)

15



## Les résultats (2)

Bilan d'azote, émissions d'ammoniac et consommations d'énergie

NIVEAU 1

Bilan d'azote :  
Entrées d'azote  
– Sorties d'azote

Excédent du bilan et  
devenir potentiel (air,  
eau, sol)

### MA GESTION DE L'AZOTE

Bilan de l'azote simplifié à l'échelle de l'atelier



La différence entre les entrées et les sorties d'azote est appelée excédent du bilan :

$$0,075 \text{ kg N/kg PV} - 0,048 \text{ kg N/kg PV} = \text{Excédent du bilan : } 0,027 \text{ kg N/kg PV}$$

Le devenir potentiel de l'excédent du bilan :



### MES PERTES D'AZOTE



\*Correspond au rapport entre l'excédent d'N et les entrées d'N



## Les résultats (2)


Bilan d'azote, émissions d'ammoniac et consommations d'énergie

NIVEAU 1


Emissions d'ammoniac  
par poste d'émissions

Consommations d'énergies  
(directes et indirectes)

### MES PERTES POTENTIELLES D'AMMONIAC VERS L'AIR



### MES CONSOMMATIONS D'ENERGIE




Comparaison à système équivalent



## Les références de comparaison


Résultat de l'éleveur :



18



## Les systèmes de référence *Volailles de chair*



LR = Label Rouge

--- Productions sur parcours

19



# Outil Niveau 2

## Quoi de plus ?

20



## Un outil multi-filières, qui s'élargit en Europe

CAP'2ER® est un **outil d'évaluation environnementale** disponible pour toutes les filières :




Et traduit dans  
plusieurs  
langues !



21




## Une vision atelier et exploitation



22




## Une approche plus complète



23



## Vers un plan de progrès



NIVEAU 2

24



## Conclusions

CAP'2ER®  
Niveau 1



- Un premier niveau **simplifié**, à l'échelle **atelier** qui permet d'être sensibilisé aux **enjeux environnementaux** (émissions azotées, émissions GES, contributions positives)
- Outil en ligne **fin Novembre 2023**
- Formations proposées par l'ITAVI début 2024

CAP'2ER®  
Niveau 2



- Un niveau 2 **complet**, à l'échelle **exploitation** qui permet d'établir un **plan de progrès** (mise en place de leviers)
- Outil en ligne **1<sup>er</sup> semestre 2024**
- Formations proposées par l'ITAVI courant 2024

25



## Accès à l'outil – Niveau 1

- Informations disponibles sur le site de l'ITAVI : <https://www.itavi.asso.fr/projets/cap-2er-r-volailles>
- Lien vers l'outil : <https://www.itavi.asso.fr/publications/cap-2er-r-evaluez-votre-empreinte-environnementale?order=score>
- Lien vers la formation : <https://www.itavi.asso.fr/page/se-former-avec-l-itavi>

**Rdv sur notre stand à l'accueil du Ponant !**

- Pré-inscriptions Formation Niveau 1
- Flyer informatif

# Merci pour votre attention !

## Des questions ?



# ITAVI

L'INSTITUT TECHNIQUE DES FILIÈRES  
AVICOLE, CUNICOLE ET PISCICOLE

## Restons en contact !

Pensez à vous inscrire à la nouvelle  
newsletter ITAVI !

sur [www.itavi.asso.fr](http://www.itavi.asso.fr)

Et suivez-nous sur les réseaux



<https://fr.linkedin.com/company/itavi>



<https://www.youtube.com/channel/UCGDWfSvRXGSVnadhMFVthQg>

Cliquez pour vous abonner

