

LUTTE CONTRE LES NUISIBLES

6F

Pourquoi est-ce important de lutter efficacement contre les nuisibles et les oiseaux sauvages ?

- **Pour limiter le stress** et la nervosité des volailles, engendrés par l'intrusion d'animaux prédateurs (renards...), parasites (poux rouges, ténébrions)
- **Pour réduire le risque d'introduction de contaminants** et d'agents pathogènes dont certains nuisibles peuvent être vecteurs (ténébrions, rongeurs, oiseaux sauvages...)
- **Pour éviter la dégradation de mes équipements** et de mon matériel ou la consommation de l'aliment destiné à mes volailles (rongeurs qui détériorent les câbles électriques, ténébrions qui creusent des galeries dans l'isolation, oiseaux sauvages ou rongeurs qui consomment l'aliment...).



Comment lutter efficacement contre les prédateurs et les oiseaux sauvages ?

Prévenir leur introduction dans les unités de production :

- **Clôturer le parcours** (obligatoire sauf label « volailles fermières élevées en liberté »)
- **Système d'effarouchement** (facultatif) peut permettre de prévenir l'introduction de prédateurs sur les parcours ou d'oiseaux sauvages. **À noter :** différents types d'effarouchement existent (visuel ou sonore), changez les régulièrement car les animaux s'accoutument à leur présence.
- Mettre de préférence les **points d'abreuvement et d'alimentation à l'intérieur du bâtiment** ou des abris, pour éviter l'attrait de l'avifaune sauvage. S'ils sont sur le parcours, les points d'abreuvement et d'alimentation doivent être couverts et il ne doit pas y avoir d'aliments au sol (cf. [fiche 6E](#)).
- **Évacuer les cadavres** quotidiennement et bien les stocker dans un contenant hermétique pour éviter d'attirer les rongeurs et les carnivores (cf. [fiche 8](#)).
- **Grillager** les fenêtres, les jupes, entrées d'air, extracteurs et lanterneaux d'aération du bâtiment pour bloquer l'accès aux oiseaux sauvages.



Stockage du fumier.
Une bonne gestion des lisiers et des fumiers est indispensable pour éviter la diffusion des maladies et contaminants, n'oubliez pas de lire les [fiche 7A](#) & [fiche 7B](#).



LE CONTRÔLE RÉGULIER des grillages abîmés, des trous sous les grillages, des terriers de renards est indispensable pour s'assurer de l'efficacité de ces barrières contre les prédateurs et oiseaux sauvages !
Ces contrôles sont à prévoir lors des vides sanitaires pour pouvoir réparer en cas de besoin (voir [fiches](#) « Plan de nettoyage et désinfection »)

► Comment lutter efficacement contre les rongeurs ?

Prévenir en premier lieu !



Ne pas laisser traîner sur les abords du bâtiment ou abri des objets pouvant servir de refuges aux rongeurs (tas de bois, poubelles, cartons vides, ferrailles ...).

Maintenir l'herbe rase sur les abords des bâtiments car les rongeurs ne traversent pas les zones découvertes. La tonte ou le déserbage est à prévoir impérativement dans le plan de nettoyage et désinfection du bâtiment et des abris (cf. fiches 6).


Ne pas laisser d'aliments sous les silos .

Éliminer les rongeurs déjà présents

Tout détenteur de volailles doit pouvoir justifier d'un **contrat de dératisation** ou d'une procédure de dératisation précisant les lieux de dépôt des appâts (plan de masse avec lieux), les dates de dépôts et fréquence de vérification. Ce document doit être conservé 5 ans au minimum (cf. [fiche](#) «Plan de biosécurité»).

Si lors des vérifications, les pièges ont été touchés : remplacer les appâts et renforcer les pièges.

Pour les lieux de dépôt des appâts, privilégier les lieux de stockage d'aliment (silos, hangars ...), le long des murs et des canalisations, des câbles verticaux, ainsi que les passages de rongeurs caractérisés par des dégâts (trous dans l'isolation, cartons ou sacs rongés, câbles rongés, amas de crottes)



► Comment lutter efficacement contre les insectes ?

Les ténébrions

- Les infestations des bâtiments par les ténébrions concernent surtout les élevages de gallinacés (litières plus humides dans les élevages de palmipèdes, moins favorables au développement des ténébrions).
- Les ténébrions sont présents dans les bâtiments sous deux stades : les adultes bien visibles (environ 20 % de la population) et les larves (80 %) cachés sous les mangeoires, dans les isolants ou dans le sol. Les produits adulticides doivent généralement être appliqués en fin de lot.
- **La lutte doit se faire dès l'enlèvement** car dès que la litière refroidit, les ténébrions vont se cacher dans l'isolation des murs et y creusent des galeries ! Les larvicides sont à utiliser plutôt en début de lot.
- Pour en savoir plus, voir le document de l'ITAVI :
« Le petit Ténébrion : comment mieux le maîtriser ? »

Mouches et poux rouges

- Les infestations de mouches et poux rouges sont communes à toutes les espèces de volailles.
- L'application d'insecticides adaptés ne se fait pas forcément à l'enlèvement.
- Les protocoles de lutte contre les insectes doivent être réfléchis avec le vétérinaire, idéalement lors du Bilan Sanitaire d'Élevage et doivent être inscrits dans le plan de biosécurité.
- Pour en savoir plus, voir les documents de l'ITAVI :
« Le pou rouge en élevage de poudeuses »
« La mouche domestique en élevage de poudeuses ».