

Améliorer les méthodes de suivi environnemental pour une gestion intégrée de l'aquaculture en mer


MÉTHODES DE SUIVI ENVIRONNEMENTAL DES INTERACTIONS ENTRE COMPARTIMENTS D'AMTI EN MER OUVERTE : EVALUATION SUR SITE

Jaeger C., Bouchemousse S., Mathonnet I., Jacquemin B., Michel R.,
Béguin R., Sadoul B., Le Bris H., Aubin J.

L'AQUACULTURE MULTITROPHIQUE INTÉGRÉE EN MER

PAS DE CONTRÔLE

- Conditions des cultures (météo, courants ...)
- Interactions entre organismes
- Apports (nutriments) et effluents



Identifier et quantifier les flux de matières entre les différents compartiments aquacoles en milieu ouvert

=> Objectif d'AMIMA : Proposition et évaluation d'une méthodologie de monitoring environnemental adaptée

- Les plus pertinents pour décrire les flux dans les systèmes AMTI
- Avantages et limites en milieu ouvert
- Complémentarités d'informations



Poster JRFP 2022

=> Deux types d'approches

Approche indirecte

Quantification des flux de matière (Azote (N) et Phosphore (P)) dans le périmètre de l'estuaire par l'utilisation de modèles de **bilan de masse**

Approche directe

Identification des flux de matière par le suivi de plusieurs **marqueurs trophiques** :

- Isotopes stables
- Acides gras
- ADN « environnemental » (non présenté)

=> Evaluation des approches choisies dans l'estuaire du Trieux




L'ESTUAIRE DU TRIEUX

- Une zone aquacole riche et diversifiée


- ❑ 2 piscicultures (13 t)
- ❑ 2 algocultures (14 ha)
- ❑ Moules de bouchots (8,9 km)
- ❑ Ostréiculture (160 ha de parcs)

- Une zone avec des références disponibles

Existence de flux de matière
entre les productions à
grande échelle ?



1 - Identification des compartiments trophiques dans l'estuaire du Trieux et recherche des particularités métaboliques





2 - Obtention de données de production et d'itinéraires techniques dans l'estuaire du Trieux auprès des producteurs de l'estuaire

3 - Bilan de masse (N, P) pour chaque compartiment trophique sur la période de production (Novembre – Juin) et variations mensuelles avec modèles de croissance

4 - Mise en relation des flux entre compartiments trophiques et élaboration de différents scénarios d'interactions

- Tous les compartiments




Solde

- 4 591 kg N
26 kg P

- Tous les compartiments + bassin versant**

← - - - Non calculé
← - - - Calculé/estimé par modèle
← - - - Calculé/estimé partiellement



Echantillonnage

1 – Répartition


- 5-10 échantillons par organisme et par site
- à 2-3 km en amont et jusqu'à 8 km en aval de la pisciculture

2 - Systèmes aquacoles (13 sites)

- Truites arc en ciel
- Huîtres creuses et plates
- Algues

3 - Milieu naturel (12 sites)

- Echantillons d'eau
- Echantillons biologiques :
 - Huîtres
 - algues



- Isotopes stables ($\delta^{13}\text{C}$ et $\delta^{15}\text{N}$)**



N = 118 échantillons (Truite : contenu stomacal, Huîtres : muscle, Fucus : Thalle)

Distribution spatiale des ‰ $\delta^{13}\text{C}$ et $\delta^{15}\text{N}$ dans les échantillons d'huîtres et d'algues

1. Grande variabilité entre échantillons dans un même secteur
2. Quelques différences significatives entre les sites échantillonnés
3. Pas de tendance observée



**Influence de la pisciculture
n'est donc pas discernable
avec le marqueur IS**



- **Acides Gras**

N = 73 échantillons (Truite : muscle + contenu stomacal, Huîtres : muscle)

1. **Nette distinction entre les truites et les huîtres**



Distribution spatiale des % d'AG dans les échantillons d'huîtres

Ex. acide palmitoléique

2. **Grande variabilité entre échantillons dans un même secteur**
3. **Pas de différence significative entre les sites échantillonnés**




**Influence de la pisciculture
n'est donc pas discernable
avec le marqueur AG**




Objectif d'AMIMA

Proposer et évaluer une méthodologie de monitoring environnemental adaptée à l'AMTI en mer



Partenariat et implication auprès des **producteurs et acteurs locaux** indispensable

Merci de votre attention



Création d'archétypes de systèmes piscicoles français et analyse de leurs performances environnementales par Analyse du Cycle de Vie (ACV)

Ninon Martin, Aurélien Tocqueville, Joël Aubin

Présentation du projet

- Affichage environnemental
- INRAE, ITAVI et CIPA
- Mise à jour des données Agribalyse




Fig. 1 : Logigramme présentant la méthode générale

Exemple de la truite arc-en-ciel (*Oncorhynchus mykiss*)

- 3 archétypes définis à ce jour :

1 Truite portion
« Petite production »

2 Truite portion
« Grande production »

3 Très grande truite
« Grande production »

- Exemples de résultats obtenus :




Fig. 2 : Graphiques de la répartition des impacts de 2 indicateurs de la méthode PEF selon les 3 archétypes

