



LE CYCLE DE VIE EN ÉLEVAGE



La pintade

ORGANISATION DE LA FILIÈRE


SÉLECTION:¹ CHEZ LES SÉLECTIONNEURS

Intégration des caractères et critères d'intérêt importants pour la filière (qualités de ponte des reproductrices, indice de consommation et conformation des pintades de chair, homogénéité des lots, résistance aux maladies, préservation du goût de sa chair...)

MULTIPLICATION : CHEZ LES ACCOUCVEURS

La multiplication sert à diffuser le progrès génétique obtenu sur des caractères complémentaires en lignées pures. Elle repose sur le croisement de ces lignées, ce qui permet à la descendance de bénéficier de la vigueur hybride, appelée effet d'hétérosis, se traduisant notamment par une amélioration des performances reproductives.

PRODUCTION : CHEZ LES ÉLEVEURS



1 : L'élevage de pintade se distingue par une pression de sélection plus modérée que celle observée dans les autres espèces

CYCLE DE PRODUCTION

AU COUVOIR



Pintadeau

- Vaccination
- Traitement non systématique de la partie distale de l'aile au couvoir¹


EN ÉLEVAGE



Pintade

(de J1 à 14 semaines d'âge, variable selon le système d'élevage)

- Arrivée en élevage, accueil et acclimatation
- Installation des perchoirs
- Croissance



À L'ABATTOIR

Abattage

(entre 11 et 14 semaines d'âge, variable selon le système d'élevage)

Conventionnel : 1,80 kg
Agriculture Biologique : 2,10 kg
Label Rouge : 2,10 kg²

Incubation des œufs

- Œufs (issus des parents) placés en incubateur
- Couvés de manière artificielle
- Durée : 27 jours

Éclosion

Mise en place chez l'éleveur

1 : Non obligatoire, pratiqué à la demande, même si encore largement répandu.
2 : Poids à l'enlèvement (poids vif avant abattage).