



LE CYCLE DE VIE EN ÉLEVAGE



La poule pondeuse

ORGANISATION DE LA FILIÈRE


SÉLECTION : CHEZ LES SÉLECTIONNEURS

Intégration des caractères et critères d'intérêt importants pour la filière (productivité, résilience, robustesse...)

MULTIPLICATION : CHEZ LES ACCOUCVEURS

La multiplication sert à diffuser le progrès génétique obtenu sur des caractères complémentaires en lignées pures. Elle repose sur le croisement de ces lignées, ce qui permet à la descendance de bénéficier de la vigueur hybride, appelée effet d'hétérosis, se traduisant notamment par une amélioration des performances reproductives.

PRODUCTION : CHEZ LES ÉLEVEURS



CYCLE DE PRODUCTION

AU COUVOIR



Poussin

- Vaccination
- Traitement non systématique du bec (IR) au couvoir¹

Incubation et éclosion des œufs

- Œufs à couver (OAC) placés en incubateur dans des conditions adaptées pendant 18 jours
- Ovoséjour entre le 12e et le 13e jour d'incubation
- Transfert en éclosoir et mirage à 18 jours
- Éclosion et sortie des poussins au couvoir à 21 jours

Éclosion

Mise en place chez l'éleveur de poulettes

Poulette

(de j1 à 17 semaines d'âge)

- Croissance des jeunes
- Préparation à la ponte
- Conditions adaptées : programme lumineux, alimentation...



Transfert chez l'éleveur de poules pondeuses

Poule pondeuse²

(de 17 à 76 semaines d'âge)

- Début de la ponte vers 20 semaines d'âge
- Pic de ponte vers 28 semaines d'âge
- Réforme vers 75 semaines d'âge en moyenne
 - Production moyenne d'environ 320 œufs par poule mise en place, selon le système d'élevage et la durée de production

Abattage

¹ : Non obligatoire, pratiqué à la demande, même si encore largement répandu.

² : Ces chiffres sont des estimations et sont basés sur les poules de souches brunes, sur une base de 518 jours. Des poules blanches sont aussi élevées en France, mais de façon minoritaire, et avec des performances de ponte différentes.